

Zabiegi profilaktyczne i pielęgnacyjne przeprowadzane na prosiętach



Odchów prosiąt

Najtrudniejszy okres w produkcji świń w którym należy przeprowadzić wiele zabiegów aby ograniczyć straty w produkcji i podnieść rentowność.



1 dzień



- Skracanie i dezynfekcja pępowiny



1 - 2 dzień



- ▶ **Przycinanie kielków** wykonywane cążkami, zabieg ogranicza kaleczenie gruczołu mlekowego i wzajemnego okaleczania się



1 - 3 dzień

- Skracanie ogonków o 1/3 długości wskazane w utrzymywaniu świń w systemach bezścielowych na rusztach



2 - 4 dzień

- **Podanie preparatu żelaza** (np. w postaci suiferrovitu). Zapobiega anemii. Nie podawać prosiętom z biegunką.



2 - 3 dzień

- **Wyrównanie liczebności miotów**. W celu umożliwienia naturalnego karmienia prosiąt. Odłączamy najsilniejsze prosięta do innych loch lub sztucznych mamek.



3 - 7 dzień

- **Kastracja knurków** w celu zapobiegania pogorszenia jakości tusz (zapach moczowo - płciowy mięsa). Obowiązkowy w produkcji tuczników. Wykonywany w 3 - 4 tygodniu wymaga znieczuleń.



4 - 6 dzień

- Dostęp do wody i paszy stałej. Woda powinna być z automatycznych poidełek smoczkowo miseczkowych. Pasza stosowana w żywieniu to prestarter podawany do płytkich korytek. Należy go podawać do tygodnia po odsadzeniu aby ograniczyć stres.



21 dzień

- Znakowanie prosiąt w stadach hodowlanych



28 - 35 - 45 dni

- **Odłączanie prosiąt od loch.** Prosięta po odłączeniu najlepiej jakby pozostały jeszcze na porodówce co ogranicza stres.

