

Typy użytkowe i rasy kóz



Typ użytkowy mleczny

- ▶ Duży wzrost – 100cm w kłębie, masa ciała 120kg
- ▶ Żywy temperament
- ▶ Dobrze rozwinięte wymię
- ▶ Wysoka wydajność mleczna (1000kg mleka w laktacji)



Koza saaneńska

- ▶ Pochodzenie: Szwajcaria
- ▶ 300dniowa laktacja 800 – 1200kg mleka
- ▶ Koza biała
- ▶ Duże rozmiary ciała 50 – 120kg



Koza alpejska

- ▶ Pochodzenie: Francja
- ▶ Zabarwienie od jasnopłowego do ciemnobrązowego z czarnymi końcami kończyn
- ▶ Wzdłuż linii grzbietowej czarna pręga, czarne okolice oczu i pyska
- ▶ 600 – 1000kg mleka



Typ użytkowy mięsny

- ▶ Zróżnicowane cechy pokrojowe i wydajność rzeźna
- ▶ Wysoka plenność (do 200%)
- ▶ Wysokie dobowe przyrosty (do 200g)
- ▶ Wydajność rzeźna ponad 60%



Koza burska

- ▶ Pochodzenie: Afryka
- ▶ Białe tułowie, czerwona głowa, średnio zwisające uszy
- ▶ Obie płcie rogate
- ▶ Bardzo plenna i asezonowa
- ▶ Dobra wydajność rzeźna, umięśnienie, wysokie przyrosty dzienne, dużo tłuszczu okrywowego w tuszy
- ▶ Niższe wymagania pokarmowe od kóz mlecznych



Typ wszechstronnie użytkowy

- ▶ Rasy o zasięgu lokalnym – doskonałe przystosowanie do miejscowych warunków środowiska
- ▶ Wszystkie kozy polskie



Koza biała uszlachetniona

- ▶ Białe umaszczenie
- ▶ Krótkie lśniące włosy
- ▶ Kozły z dość obfitą brodą, grzywką nad oczami
- ▶ Osobniki bezrożne i z rogami
- ▶ Kuliste, dobrze rozwinięte wymię
- ▶ Wysoka wydajność mleka 650 – 900kg
- ▶ Plenność 120%



Koza barwna uszlachetniona

- ▶ Sarnio-brązowy tułów z ciemną pręgą wzdłuż grzbietu, czarne końce nóg, czarne zabarwienie przy oczach i pysku
- ▶ Stojące uszy
- ▶ Krótka sierść
- ▶ Zwyczajnie bezrożne
- ▶ Odporność na warunki środowiskowe
- ▶ Wysoka wydajność mleczna



Kozy bezrasowe

- ▶ Bardzo duża odporność na warunki środowiska
- ▶ Wysoki poziom tłuszczu w mleku
- ▶ Dobra plenność



Typ ogólnoużytkowy

► Nubijska



Karpacka



Sandomierska



Selekcja kóz

- ▶ Umaszczenie charakterystyczne dla danej rasy
- ▶ Kształt uszu
- ▶ Czynne strzyki dodatkowe, podwójne kanały strzykowe, brak części wymienia, skrócona żuchwa, mysie uszy – dyskwalifikacja
- ▶ Wydajność za 300-dniową laktację
- ▶ Masa ciała kóz dorosłych
- ▶ Masa ciała koźląt w wieku 5 m-cy
- ▶ Kozioł stadny – minimum wydajności mlecznej matek, pochodzenie z miotu bliźniaczego

