


Przygotowanie do porodu



Przygotowanie do porodu

- ▶ Odrobaczenie lochy na co najmniej 5 dni przed przeniesieniem do kojca porodowego
- ▶ Szczepienia i iniekcje preparatów witaminowych nie później niż na 2 tyg. przed terminem porodu
- ▶ Przygotowanie kojca
- ▶ Umycie lochy
- ▶ Przeniesienie do kojca porodowego nie później niż na tydzień przed spodziewanym terminem porodu
- ▶ Dodatek pasz włóknistych, zmiana poziomu żywienia
- ▶ Włączenie źródła ciepła



Objawy zbliżającego się porodu

- ▶ Niepokój lochy
- ▶ Rozluźnienie więzadeł miedniczo-krzyżowych
- ▶ Opadnięcie brzucha



Poród

Trwa od 2 do 7 godzin najczęściej w nocy. W fermach wielkostadnych prowadzi się synchronizację rui aby lochy z jednej grupy technologicznej wyprosiły się jednego dnia. Podaje się hormon prostaglandynę.

Przy porodzie locha leży i wydala co 15 min kolejne prosięta. Wydalenie łożyska świadczy o zakończeniu porodu.



Żywienie lochy przed porodem

- ▶ W dniu porodu lochy nie karmimy
- ▶ Dla niespokojnych loch można podawać pójło z otręb pszennych
- ▶ Stały dostęp do wody



Obserwacja po porodzie

- ▶ Temperatura normalna 38,5 stopni Celciusza mierzona w odbytnicy
- ▶ Zachowania lochy i prosiąt (instynkt macierzyński)
- ▶ Apetytu lochy
- ▶ Stan gruczołu mlekowego

